

資料・証言による昭和南海地震前の四国の隆起について

○重富國宏・浅田煕行・梅田康弘・辰己賢一

1. 梅田モデルの検証

昭和南海地震（1946、M8.0）の1週間前から直前にかけて、紀伊半島から四国の太平洋沿岸の広い範囲で、井戸水が減った或いは涸れたという報告がある（水路局、水路要報、1948）。南海地震の震源域・固着域に関する最近の研究成果と、異常が報告された井戸の地形的特徴を併せて考察することにより、梅田・他は地震前に井戸水が減少するメカニズムについてのモデルを提唱している（地震予知連絡会会報、第70巻、2003）。

モデルには検証が必要である。梅田モデルにおいては、地震発生前のプレスリップによる隆起を前提としている。橋本は、昭和南海地震のコサイスミック断層モデルを基にシミレーションをおこない、地震前の地下水位低下がみられた地域がプレスリップによる隆起地域と矛盾しないプレスリップ断層モデルを提唱した（地震予知連絡会会報、第70巻、2003）。これにより、梅田モデルは一つの現実性を得たといえる。一方、地震前の隆起を直接裏付けるような明確な観測事実は見

出されていない。そこで我々は、地震前の隆起と関連の可能性が高いと考えられる地震前の異常潮位に注目し、史料・証言等による調査を試みた。

2. 須崎市野見湾の異常潮位

地震前の異常潮位についてはいくつかの報告の中に散見するが、現在までの我々の調査の範囲で、異常潮位の原因が海底の地殻変動（隆起）である可能性を示唆するものとしては、高知県須崎市発行（1995）「海からの警告」がある。同書に、地震発生前日1946年12月20日の夜半から地震発生直前までの、須崎市野見湾における異常潮位についての漁師の証言を纏めたものがある。それによれば、日没を待って外海の漁場に向かった漁船が操業を終え、帰港の途中、異常な干潮に遭遇し、上げ潮になつても潮位が上がらず船を舫うのに難儀した事態が詳しく記されている。海底の隆起の可能性を覗わせる、地震発生数時間前から発生した異常に低い潮位を示す貴重な資料である。体験者の証言を交えて紹介する。

資料 1




図 1. 漁師の証言に基づく須崎市野見湾における潮位異常（「海からの警告」、1995 付図）